

FLEGACTIV-S

(FAS)

Profesionální řešení
pro Vás

Prevence proti virům a bakteriím

baktericidní

virucidní

tuberkulocidní

FLEGACTIV-S

(FAS)

Profesionální řešení
pro Vás

Použití:

FLEGACTIV-S: Používá se 2 x 3ml neředěného roztoku přípravku, doba působení 2 x 30 sekund. Přípravek se aplikuje na důkladně umyté, opláchnuté a osušené ruce nebo na kontaminované ruce. Expozice 30 sekund – baktericidní a fungicidní účinnost; expozice 1 minuta – virucidní a tuberkulocidní účinnost. **Pro chirurgické použití:** Aplikuje se na důkladně umyté, opláchnuté a osušené ruce. Aplikace 2 x 3ml přípravku po dobu 3 minut. **Baktericidní ošetření pokožky:** Přípravek nanést sterilním tamponem či mulem, expozice 1 minuta. **Při použití elektrických přístrojů je třeba vyčkat úplného zaschnutí.**

Skladování:

Skladujte v originálních obalech při teplotě 5-25 °C, chráněné před tepelným a slunečním zářením. Při skladování větších množství dodržujte pravidla pro skladování hořlavin. Uchovávejte mimo dosah dětí, odděleně od potravin a krmiv.

Likvidace odpadu:

Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad.

Přípravek obsahuje: propan-2-ol 80%

Značení a první pomoc: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje vážné poranění očí. Chraňte před světlem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zamezte vdechování par/aerosolů. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

Balení: 500ml